



بررسی اثرات سطوح مختلف شوری، بسترکشت‌های مختلف بدون خاک و برهمکنش آن‌ها بر تولید نشاء گوجه فرنگی (*Lycopersicon esculentum*)

مجتبی قاسمی^{1*}، محمد هدایت²، غفار کیانی³

1. دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

طبیعی ساری، ساری

2. استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

3. استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

*E-mail: m.ghasemi22@gmail.com

چکیده:

به منظور تولید و عملکرد بالاتر گوجه فرنگی به نشاء با کیفیت نیاز است. نظر به اینکه بیشتر منابع آب استان بوشهر شور بوده و ضایعات کشاورزی از قبیل کاه گندم و ضایعات نخل خرما در آنجا به وفور یافت می‌شود، آزمایشی به منظور بررسی تأثیر تنش شوری و انواع بسترکشت بر تولید نشاء گوجه فرنگی رقم گیلانی زرد، با استفاده از 4 سطح شوری کلرید سدیم (0، 2، 4 و 6 دسی زیمنس بر متر) و 7 بستر کشت (خرما 1:2 کوکوپیت، خرما 1:1 کوکوپیت، خرما 2:1 کوکوپیت، کاه 1:2 کوکوپیت، کاه 1:1 کوکوپیت، کاه 2:1 کوکوپیت، کوکوپیت) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس انجام شد. در مرحله نشاءیی میزان کلروفیل، اندازه سطح برگ، طول ساقه، ریشه و دم‌برگ، قطر ساقه، تعداد ریشه، وزن خشک ریشه و شاخساره گیاه اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که اثر تنش شوری بر تمام صفات اندازه‌گیری شده معنی‌دار می‌باشد و بین بسترهای مختلف کشت از نظر تمام صفات اختلاف بسیار معنی‌داری وجود داشت. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، از بین 7 بستر کشت مورد استفاده در سطوح مختلف شوری، ترکیب کاه و کوکوپیت به نسبت 1:2 از نظر کلیه صفات به عنوان بهترین بستر کشت تحت تنش شوری گزارش می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: بستر کشت بدون خاک، شوری، ضایعات کشاورزی، گوجه فرنگی

مقدمه

نظر به اینکه بیشتر منابع آبی استان بوشهر شور بوده و ضایعات کشاورزی از قبیل کاه گندم و ضایعات نخل خرما در آنجا به وفور یافت می‌شود، و همچنین در مناطق جنوبی کشور با آب و هوای گرم، تولیدات خارج از فصل به دلیل ارزش افزوده‌ی بالا رو به گسترش است. در این راستا تولید نشاء به صورت یک حرفه‌ی اختصاصی رو به فزونی نهاده است. انتظار می‌رود کاربرد ضایعات کشاورزی از قبیل کاه گندم و ضایعات نخل خرما به جای کوکوپیت و پرلایت بتواند ضمن کاهش هزینه‌ها باعث افزایش کیفیت و کمیت نشاء گوجه فرنگی گردد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی بهترین بستر(های) کشت برای تولید نشاء گوجه فرنگی رقم گیلانی تحت شرایط تنش شوری با استفاده از پس مانده‌های کشاورزی قابل دسترس گیاهی در منطقه بوشهر می‌باشد.

مواد و روش‌ها



این پروژه در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش از گوجه فرنگی رقم گیلاسی زرد استفاده گردید. تیمارها شامل شوری (NaCl) در 4 سطح (0، 2، 4 و 6 دسی زیمنس بر متر) و 7 نوع بسترکشت بدون خاک شامل (خرما:2:1 کوکوپیت، خرما:1:1 کوکوپیت، خرما:2:1 کوکوپیت، کاه:2:1 کوکوپیت، کاه:1:1 کوکوپیت، کاه:2:1 کوکوپیت، کوکوپیت) بود. پس از این که نشاءها 50 روزه شدند با استفاده از دستگاه کلروفیل-سنج میزان کلروفیل اندازه گیری شد. سپس نشاءها با دقت از گلدان خارج و طول ساقه، ریشه و دمبرگ با استفاده از خط کش، سطح برگ با دستگاه سطح سنج برگ، وزن خشک شاخساره و ریشه پس از شستن و خشک کردن با ترازوی دقیق و قطر ساقه با کولیس اندازه گیری شد. کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار آماری MSTAT-C و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال 5% انجام شد. رسم نمودارها به کمک نرم افزار Excel انجام شد.

نتایج و بحث:

نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف شوری بر تمام صفات اندازه گیری شده بسیار معنی دار است و اثر بستر کشت نیز بر تمام صفات معنی دار بود. همچنین اثر متقابل شوری بر بستر کشت نیز در تمام صفات بررسی شده معنی دار بود. مقایسه نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری تا 4 دسی زیمنس بر متر صفات مورد مطالعه کاهش محسوسی نشان ندادند و به ترتیب بستر کشت های کاه 1:2 کوکوپیت (S_3M_4)، خرما 1:1 کوکوپیت (S_3M_2) بهترین بسترهای کشت در غلظت شوری 4 دسی زیمنس بر متر از نظر کلیه صفات اندازه گیری شده بودند (جدول 1). احتمال می رود که کاربرد ضایعات کشاورزی از قبیل کاه گلش گندم و ضایعات نخل خرما باعث تعدیل میزان نمک در محیط ریشه شده و کوکوپیت نیز از کاهش رطوبت و مواد غذایی جلوگیری کرده و موجب رشد مناسب نشاء گوجه فرنگی شده است. افزودن ضایعات کشاورزی از قبیل کاه گندم و ضایعات نخل خرما به کوکوپیت موجب افزایش صفات اندازه گیری شد. افزودن کاه و گلش گندم به بستر کشت‌ها بیشترین اندازه سطح برگ، طول ساقه، ریشه و دمبرگ، قطر ساقه، تعداد ریشه، وزن خشک ریشه و شاخساره گیاه را به همراه داشت (شکل 1). این نتایج بدست آمده با نتایج چن و همکاران (2010) در بررسی اثر شوری و تخلخل بر کمپوست تهیه شده از لجن فاضلاب بر رشد گیاهچه های گوجه فرنگی، فلفل و خیار، هنگامی که میزان نمک مناسب بود، کمپوست حاصل از لجن فاضلاب به تنهایی به عنوان بسترکشت مناسبی برای این سبزیجات می تواند باشد و نیازی به مخلوط کردن با مواد دیگر ندارد. روبیو و همکاران (2010) بهبود تنش شوری از طریق مدیریت آبیاری و بستر کشت بدون خاک در گیاهان فلفل رشد یافته در کوکوپیت را بررسی و نتیجه گرفتند که افزایش دور آبیاری و ضایعات کشاورزی مثل کوکوپیت و نخل خرما در شرایط هیدروپونیک با کاهش اثر شوری باعث افزایش بیوماس کل می شود. آل تیری و همکاران (2010) از ضایعات کشاورزی به عنوان جایگزین مناسب بسترکشت پیت جهت تولید توت فرنگی استفاده نمودند و نشان دادند که این ضایعات بدلیل افزودن مواد مغذی به بستر کشت موثر بوده و از کاربرد این ضایعات نتایج موفقیت آمیزی گزارش کردند، که نشان از هم جهت بودن پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، از بین 7 بستر کشت مورد استفاده در سطوح مختلف شوری، ترکیب کاه و کوکوپیت به نسبت 1:2 از نظر کلیه صفات به عنوان بهترین بستر کشت تحت تنش شوری معرفی می گردد. از آن جا که نیمی از 12% اراضی قابل کشت کشور به درجات مختلف با مشکل شوری مواجه هستند، لذا مدیریت استفاده از آب در این مناطق به دلیل محدودیت منابع آب شیرین و با توجه به درجه حساسیت گیاه در مراحل مختلف رشد، ضروری به نظر می رسد.



جدول 1: مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها بر صفات مورد مطالعه در گیاه گوجه فرنگی رقم گیلاسی زرد

وزن خشک ریشه (gr)	وزن خشک شاخساره (gr)	قطر ساقه (mm)	طول دمبرگ (mm)	طول ریشه (cm)	اندازه سطح برگ (cm ²)	تعداد ریشه	طول ساقه (cm)	میزان کلروفیل	اثرات متقابل
0/127 b	0/203 de	1/15 ef	14/67 fg	4/80 b-i	4/52 d	8/67 cde	3/93 de	19/70 j	S ₁ M ₁
0/113 b	0/203 de	1/41 e	10/67 f-j	3/70 d-i	5/37 d	4/67 de	3/60 de	16/03 k	S ₁ M ₂
0/110 b	0/153 e	1/51 e	7/00 ij	2/70f-i	6/01 d	5/33 de	3/14 de	9/40 lm	S ₁ M ₃
0/123 b	0/283 de	1/15 ef	21/00 de	7/01b-g	5/66 d	7/00 cde	4/43 de	29/47 ef	S ₁ M ₄
0/133 b	0/177 e	1/40 e	7/67 hij	3/18 e-i	3/49 d	7/00 cde	3/24 de	35/40 d	S ₁ M ₅
0/137 b	0/300cde	1/83 de	12/00 f-i	5/44b-h	5/99 d	8/00cde	4/98 de	9/63 l	S ₁ M ₆
0/167 b	0/390cde	2/35cde	25/33 cd	5/23b-h	7/43 d	11/33cde	4/91 de	30/17 e	S ₁ M ₇
0/117 b	0/183 e	1/65 e	11/00 f-j	5/07 b-i	1/64 d	8/00 cde	3/40 de	19/33 j	S ₂ M ₁
0/103 b	0/137 e	1/50 e	5/33 jk	1/57 hi	1/08 d	3/00 de	2/90 de	8/20 lm	S ₂ M ₂
0/120 b	0/217 de	1/45 e	20/33 de	6/90b-g	3/16 d	9/33 cde	3/73 de	23/27 hi	S ₂ M ₃
0/123 b	0/237 de	1/81 de	13/33fgh	5/33b-h	2/33 d	5/67 de	5/00 de	27/80 efg	S ₂ M ₄
0/243 b	0/600 bc	3/26abc	34/00 b	15/50 a	14/19 d	33/67 b	15/00ab	44/67 b	S ₂ M ₅
0/150 b	0/360cde	2/14cde	26/67 c	8/17b-e	8/64 d	12/33 cd	7/43 cd	40/27 c	S ₂ M ₆
0/110 b	0/147 e	1/50 e	5/67 j	2/23ghi	1/91 d	4/33 de	2/90 de	21/53 ij	S ₂ M ₇
0/123 b	0/217 de	1/43 e	12/33 f-i	5/40b-h	52/59 bc	8/33 cde	5/67 de	8/03 lm	S ₃ M ₁
0/490 a	0/977 a	4/08 ab	38/00 ab	14/17 a	54/40 bc	54/00 a	20/00 a	56/40 a	S ₃ M ₂
0/113 b	0/183 e	1/28 ef	12/33 f-i	2/90 f-i	50/68 bc	3/33 de	3/73 de	29/17 ef	S ₃ M ₃
0/430 a	0/957 a	4/40 a	43/00 a	14/00a	57/66 bc	45/00 a	19/00 a	43/97 b	S ₃ M ₄
0/233 b	0/530 cd	3/03bcd	23/33 cd	9/00 bc	50/85 bc	17/67 c	10/83bc	46/73 b	S ₃ M ₅
0/123 b	0/233 de	1/54 e	16/67 ef	3/87 c-i	43/43 c	7/33 cde	5/50 de	25/97 fgh	S ₃ M ₆
0/103 b	0/150 e	1/50 e	5/33 jk	2/57 f-i	43/23 c	1/33 de	3/47 de	3/67 n	S ₃ M ₇
0/133 b	0/287 de	1/17 ef	16/67 ef	8/73bcd	65/22 b	10/67cde	5/43 de	28/17 efg	S ₄ M ₁
0/113 b	0/177 e	1/31 ef	8/67 g-j	5/90b-h	41/00 c	6/00 cde	3/27 de	25/13 gh	S ₄ M ₂
0/140 b	0/153 e	1/28 ef	13/33fgh	3/63 d-i	48/56 bc	3/67 de	3/50 de	6/07 mn	S ₄ M ₃
0/377 a	0/843 ab	3/71 ab	42/67 a	7/73 b-f	90/12 a	50/67 a	18/47 a	40/43 c	S ₄ M ₄
0/127 b	0/260 de	1/14 ef	12/33 f-i	9/43 b	49/48 bc	11/00cde	5/37 de	19/87 j	S ₄ M ₅
0/100 b	0/100 e	0/00 f	0/00 k	0/00i	0/00 d	0/00 e	0/00 e	0/00 o	S ₄ M ₆
0/123 b	0/243 de	1/45 e	13/33fgh	4/77 b-i	63/23 b	5/33 de	5/47 de	0/00 o	S ₄ M ₇



*: مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن ($\alpha=0/05$)، اعداد با حروف مشابه فاقد اختلاف معنی دارند.

** : S₁= 0 dsm⁻¹, S₂= 2 dsm⁻¹, S₃= 4 dsm⁻¹, S₄= 6 dsm⁻¹.









دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)

M₁: خرما 1:2 کوکوبیت، M₂: خرما 1:1 کوکوبیت، M₃: خرما 2:1 کوکوبیت، M₄: کاه 1:2 کوکوبیت، M₅: کاه 1:1 کوکوبیت، M₆: کاه 2:1 کوکوبیت، M₇: کوکوبیت***



M₇=کوکوبیت



ج
1-ج) تعداد ریشه

ب
1-ب) طول ساقه

الف
1-الف) میزان کلروفیل

و
1-و) طول دمبرگ

ه
1-ه) طول ریشه

د
1-د) سطح برگ

ط
1-ط) وزن خشک ریشه

ح
1-ح) وزن خشک شاخساره

ز
1-ز) قطر ساقه

شکل ۱: مقایسه انواع بستر کشت برای صفات مختلف مورد مطالعه در گیاه گوجه فرنگی رقم گیلانی زرد



دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)

منابع:

1. Altieri R, Esposito A, Baruzzi G. 2010. Use of olive mill waste mix as peat surrogate in substrate for strawberry soilless cultivation. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 64: 670-675.
2. Chen T, Cai H, Liu H, Gao D, Zheng G, Zhang J. 2010. The effect of salinity and porosity of sewage sludge compost on the growth of vegetable seedlings. *Scientia Horticulturae*, 124: 381–386.
3. Rubio JS, Rubio F, Martínez V, García-Sánchez F. 2010. Amelioration of salt stress by irrigation management in pepper plants grown in coconut coir dust. *Agricultural Water Management*, 97: 1695–1702.