

بررسی تاثیر انواع و مقادیر مختلف کود در بسترهاي مختلف رشد جهت تولید نشاء توتون

در خزانه هاي شناور

عبدالغفور قلی زاده^۱، محمد تقى شامل‌rstemi^۲، مهيار مشتاقی^۱

۱: محقق گروه زراعت و اصلاح نبات ۲: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

مقدمه:

با وجود اينكه خزانه‌های شناور در اغلب کشورها به عنوان يك روش اصلی جهت تولید نشاء توتون مورد استفاده قرار گرفته و جايگزين روش سنتی شده است. ولی در ايران، هنوز از روش سنتی استفاده شده و توتونکاران ما، به جز تعداد محدود، اطلاع چندانی از تهيه نشاء توتون در خزانه‌های شناور ندارند. در اغلب کشورها، بستر استفاده شده در خزانه‌های شناور بر پایه خاک پیت با ترکیبات مختلفی از ورمیکولیت و پرلیت می‌باشد لذا توصیه‌های کودی نیز بر مبنای بسترهاي فوق انجام شده است. جونز و همکاران (۲) در بررسی‌های گستردگایی که انجام دادند نتیجه گرفتند که مصرف ۱۰۰ میلی‌گرم ازت در لیتر به آب حوضچه در ۳ هفته بعد از بذرگذاري در بسترهاي مختلف که با کود پایه ۶۰۰ میلی‌گرم ازت در لیتر از منبع ۲۰-۱۰-۲۰ کوددهی شده اند بهترین نتیجه را داده است. آندینو و گارسیا (۱) در آزمایشي که در کوبا جهت تولید نشاهای توتون به روش خزانه هاي شناور انجام دادند نشان دادند که بهترین نشاهای توتون با مصرف ۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر، ۶۰ میلی‌گرم فسفر در لیتر و ۵۰ میلی‌گرم پتاسیم در لیتر بدست آمد. پيرس و زلزنیک (۳) جهت ارزیابي بسترهاي غير خاکي در روش خزانه‌های شناور از منبع کودی ۲۰-۱۰-۲۰ به مقدار ۱۰۰ میلی‌گرم ازت در لیتر استفاده کردند.

روش تحقیق:

آزمایishi در گلخانه مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به صورت فاكتورييل اسپليت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفي در ۳ تكرار اجرا شد. به طوری که فاكتورهاي انواع کود (A) و مقادير مختلف آن (B) در كرتهاي اصلی به صورت فاكتورييل و فاكتور انواع بستر(C) در كرتهاي فرعی قرار گرفتند. که فاكتور انواع بستر در ۶ نوع بستر (۱) کود حيواني (۲) خاک جنگلی نوشهر (۳) کود حيواني (۴) خاک جنگلی نوشهر ۵٪+ کود حيواني (۵) خاک جنگلی نوشهر ۷٪+ پوست تجزيه شده درختان (۶) خاک پیت (واردادتی) و فاكتور انواع کود در ۲ نوع کود مركب محلول در آب (گرومور: ۲۰-۱۰-۲۰ و فرتی گرو: ۲۰-۲۰-۲۰) و مقادير مختلف کود در ۳ سطح (۱۰۰، ۵۰، ۱۵۰ ميلى‌گرم ازت در لیتر) مورد بررسی قرار گرفتند. در اين آزمایيش هر سيني یونوليتی ۲۴۲ حفره‌اي يك واحد آزمایishi را تشکيل مي‌دهد. ابتدا سيني‌ها با ۶ نوع بستر پر و عمل بذرگذاري انجام شد. قبل از شناور کردن سيني‌ها، جهت ضد عفنوي آب حوضچه‌ها قارچکش ريدوميل مانکوزب و جهت کاهش مقدار بيكربنات آب مصرفی به كمتر از ۲ ميلى‌اكي‌والان در لیتر، اسيدسولفوريک غليظ به تمام حوضچه‌ها اضافه شدند. کوددهی مرحله اول قبل از شناور کردن سيني‌ها بصورت تيمارهاي کودی، و کوددهی مرحله دوم به مقدار ۱۵۰ ميلى‌گرم ازت در لیتر از منبع نيترات آمونيوم در دو هفته بعد از شناور کردن سيني‌ها انجام شد. برای تمام تيمارها، صفات درصد بذرهاي جوانه زده و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه اندازه‌گيري شد. در نهايit داده‌ها در محبيت نرمافزار آماري SAS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

نتایج و بحث:

بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده‌ها، تاثیر انواع کود، مقادیر کود و انواع بستر بر درصد جوانه زنی و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. همچنین اثر متقابل انواع کود در مقادیر کود بر درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل انواع کود در مقادیر کود در انواع بستر بر درصد جوانه زنی و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود.

مقایسه میانگین اثر انواع کود بر درصد جوانه زنی و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه توسط آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که کود گرومور دارای بیشترین درصد جوانه زنی (۸۴,۶۵٪) و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه (۶۴,۴۶٪) بوده و در گروه a قرار گرفت. مقایسه میانگین اثر مقادیر کود بر درصد جوانه زنی و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه نشان داد که ۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر دارای بیشترین درصد جوانه زنی (۸۶,۹۲٪) و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه (۷۴,۷۴٪) بوده و در گروه a قرار گرفت. مقایسه میانگین اثر انواع بستر بر درصد جوانه زنی و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه نشان داد که بسترهای خاک پیت وارداتی و خاک جنگلی نوشهر دارای بیشترین درصد جوانه زنی و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه نشان داد که بسترهای خاک پیت وارداتی و خاک جنگلی نوشهر دارای بیشترین درصد جوانه زنی و درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه بوده و هر دو بستر در گروه a قرار گرفتند. مقایسه میانگین اثر انواع کود در مقادیر کود نشان داد (جدول ۱) که در هر دو نوع کود، بیشترین مقدار کود دارای کمترین درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه بوده و مصرف ۱۰۰ میلی‌گرم ازت در لیتر از منبع کود گرومور دارای بیشترین درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه (۵۹,۲۲٪) بود.

جدول ۱: مقایسه میانگین اثرات متقابل انواع کود بر درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه

نوع کود	مقدار	نوع کود	مقدار
۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر	۱۰۰ میلی‌گرم ازت در لیتر	۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر	۱۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر
۴۹,۶۹ ^b	۵۹,۲۲ ^a	۵۱,۹۷ ^b	گرومور
۲۲,۲۶ ^d	۳۶,۵۲ ^c	۵۲,۸۴ ^b	فرتی گرو

مقایسه میانگین اثر انواع کود در مقادیر کود در انواع بستر نشان داد که از نظر درصد جوانه زنی ۱۷ تیمار در گروه اول قرار گرفتند که تیمار مربوط به مصرف ۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر از منبع کود گرومور در بستر خاک جنگلی نوشهر دارای بیشترین درصد جوانه زنی (۹۳,۸۷٪) بوده و از نظر درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه نیز ۴ تیمار در گروه اول قرار گرفتند (جدول ۲). که تیمار مربوط به مصرف ۱۰۰ میلی‌گرم ازت در لیتر از منبع کود گرومور در بستر پیت وارداتی دارای بیشترین درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه (۷۹,۱۳٪) بود. چون هدف از این آزمایش انتخاب بستر جایگزین پیت وارداتی می‌باشد با توجه به جدول شماره ۲ از خاک جنگلی نوشهر با مصرف ۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر از منبع کود گرومور یا فرتی گرو بعنوان بستر جایگزین پیت وارداتی استفاده نمود.

جدول ۲: چهار تیمار برتر مربوط به اثرات متقابل نوع کود در مقدار کود در نوع بستر بر درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه.

نوع کود	مقدار کود	نوع بستر	درصد نشاء قابل انتقال به مزرعه
گرومور	۱۰۰ میلی‌گرم ازت در لیتر	پیت وارداتی	۷۹,۱۳
گرومور	۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر	خاک جنگلی نوشهر	۷۶,۸۵
فرتی گرو	۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر	پیت وارداتی	۷۴,۵۸
گرومور	۱۰۰ میلی‌گرم ازت در لیتر	خاک جنگلی نوشهر	۷۱
فرتی گرو	۵۰ میلی‌گرم ازت در لیتر	خاک جنگلی نوشهر	۷۰

منابع:

1. Andino, V. and M. Garcia, 1998. Experiences in Cuba with the float trays system in the production of tobacco seedling. Bull. spec. Corresta Congress Brighton, p.102, abstr. Apost 1.
2. Jones, M. A.,G. S. Miner, and W.D. Smith, 1993. Production of flue-cured tobacco seedling in green houses. Effects of media and fertilization on the direct –seeded float system. Tob Rptr. P.65-69.
3. Pearce, B. and J. Zeleznik.1999. Evaluation of soil less media used in tobacco float systems. Agronomy Notes. Vol. 31,No.5.