

بررسی تاثیر باکتری های سودوموناس بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج (*Oriza sativa L.*) در شرایط گلخانه ای

حسین جعفرزاده ذغالچالی^۱، علی رضا فلاح نصرت آباد^۲، محمد طاهر نظامی^۳، محمود رضا رمضانپور، امید قاسمی چپی^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و مسئول آزمایشگاه خاک و آب-۲- استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب-۳- استاد دانشگاه و مدیر گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج-۴- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

مقدمه

برنج (*Oriza sativa L.*) یکی از محصولات راهبردی کشور است. طبق آخرین آمار سطح زیر کشت شلتوك ۶۱۵ هزار هکتار، تولید کل شلتوك ۲/۷۷ میلیون تن با عملکرد ۴/۵ تن در هکتار است که این عملکرد با توجه به تولید ارقام جدید پرمحصول و تامین بهینه نیاز غذایی حتی به بیش از مقدار افزایش عملکرد هکتاری که در برنامه سوم و چهارم توسعه دیده شده، قابل افزایش خواهد بود(۲). حد بحرانی فسفر در خاک های شالیزاری شمال را ۱۰ الی ۱۲ میلی گرم در کیلو گرم برای برداشت حدود شش تن در هکتار شلتوك گزارش نمونه اند(۴). مصرف بی رویه کودهای شیمیایی فسفاته که حاوی کادمیوم می باشند دارای اثر سوء در افزایش عملکرد و سلامت جامعه می باشد، همچنین زیادی فسفر در برخی شالیزارها موجب کوتولگی قد بوته های برنج شده است(۵). در ایران تاثیر سودوموناس ها بر جذب عناصر غذایی و عملکرد برخی محصولات از جمله گندم بررسی شده است اما با تمرکز بر میزان فسفر و سطوح مختلف فسفر خاک و گونه های مختلف باکتری سودوموناس بر برنج گزارشی مشاهده نشده است. باکتری های جنس سودوموناس متعلق به خانواده *Pseudomonadaceae* بوده و به شکل میله ای راست یا کمی خمیده دارای تاژک قطبی، بدون اسپور و گرم منفی و گونه هایی از جمله *P.fluorescent*, *P.aerugenosa*, *P.putida* می باشند. اصطلاح PGPR برای باکتری های ریزوسفری متعلق به گروه سودوموناسهای فلورسنت (گونه های فلورسنس و پوتیدا) وضع گردید و دلیل آن افزایش قابل توجهی بود که در رشد گیاهان تلقیح شده با این باکتری ها مشاهده می شد،(۶). بیشترین تاثیر انواع PGPR در مورد محصولاتی با دوره های کشت کوتاه می باشد(۷). از جمله مکانیسم های مهم باکتری های محرك رشد گیاه برای بهبودی رشد عملکرد گیاه تولید هورمونهای گیاهی است که با ساخته شدن و رها سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی ، مکانیسمهای موثر در مبارزه بیولوژیکی فراهم می نماید . این باکتری ها موادی به نام تنظیم کننده های رشد تولید می کنند که به عنوان متابولیتهاي ثانويه ، تاثير مستقيم و غير مستقيم بر مراحل فيزيولوژيك رشد گیاهان دارند . همچنین حلالیت فسفر توسط اين باکتری ها از جمله خصوصیات مهم محرك رشد بودن انها است(۱،۳) . شرایط گلخانه ای لازم است ، تا تاثیرات آن بر جذب عناصر غذایی و عملکرد دانه برنج بررسی شود. لذا این تحقیق به منظور بررسی تاثیر این باکتری ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد انجام گردید.

مواد و روش ها :

این تحقیق به صورت گلخانه ای با سه جدایه از باکتری های سودوموناس به شمارهای ۱۶۹، ۱۷۰ و ۴۲۳ و یک تیمار شاهد بهمراه ۵ سطح کودی فسفر شامل ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵، ۰ کیلو گرم در هکتار بر روی برنج به روش آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۷ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران اجرا شد . قبل از اجرای آزمایش نمونه خاک جهت تجزیه فیزیکی و شیمیایی و با روش های استاندارد موسسه تحقیقات خاک و آب تهیه شد. خاک ها را از الک ۵ میلی متری رد کرده و کاملا بهم زده

و در گلدانها ریخته و کودهای ازته و پتاسیمی قبل از کاشت بر اساس آزمون خاک مصرف شدند. بذور(رقم فجر) قبل از کاشت به مدت ۳ ساعت با ایزوله های باکتریایی تلچیح کرده و سپس عملیات کاشت انجام شد. در طول دوره رشد استفاده از کود سرک ازته، آبیاری و وجین علوفهای هرز و سایر عملیات داشت صورت گرفت. در مرحله برداشت، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد محا سبه گردید. و درنهایت نتایج بدست آمده با نرم افزار **MSTAT C** تجزیه آماری گردیدند.

نتیجه و بحث:

اثرات متقابل باکتری و فسفر در سطح ۵٪ معنی دار شده است بطوریکه تیمار مصرف ۵۰ کیلو گرم در هکتار فسفر با باکتری شماره ۱ در گروه **a** قرار داشته که نسبت به شاهد ۹۹/۶ درصد افزایش عملکرد را نشان می دهد. اثر اصلی فسفر بر عملکرد دانه در سطح ۵٪ معنی دار شده است بطوریکه مصرف فسفر در سطوح ۵۰ و ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار در گروه **a** قرار گرفته و نسبت به شاهد (عدم مصرف فسفر) که در گروه **b** قرار گرفته بیشترین عملکرد را نشان می دهند. اثر اصلی باکتری بر عملکرد دانه در سطح ۵٪ معنی دار شده است بطوریکه باکتری شماره ۱ با ۱۱۴/۳ دانه در خوشه در گروه **a** قرار دارد که نسبت به شاهد (عدم مصرف فسفر) ۳۹/۲ درصد افزایش در تعداد دانه در خوشه را نشان می دهد. اثرات متقابل باکتری و فسفر در سطح ۵٪ معنی دار شده است بطوریکه باکتری شماره ۱ با ۱۲۴/۲ دانه در خوشه و فسفر ۵۰ کیلو گرم در هکتار در گروه **a** قرار دارد که نسبت به شاهد ۶۴/۶ درصد افزایش در تعداد دانه در خوشه را نشان می دهد. اثر اصلی فسفر بر تعداد خوشه در سطح ۵٪ معنی دار نشده است. اثر اصلی باکتری بر عملکرد دانه در سطح ۵٪ معنی دار شده است بطوریکه باکتری شماره ۱ با تعداد ۱۹/۹ خوشه در گروه **a** قرار دارد که نسبت به شاهد ۲۶/۷ درصد افزایش در تعداد خوشه را نشان می دهد. اثرات متقابل باکتری و فسفر در سطح ۵٪ معنی دار شده است بطوریکه باکتری شماره ۱ و فسفر ۵۰ کیلو گرم در هکتار با ۲۱/۳ تعداد خوشه در گروه **a** قرار دارد که نسبت به شاهد ۴۴/۹ درصد افزایش در تعداد خوشه را نشان می دهد.

منابع:

- ۱-آستانایی ، ع و عوض کوچکی، (۱۳۷۵)، کاربرد کود های بیولوژیک در کشاورزی پایدار ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- ۲-بی نام. ۱۳۷۹. آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۷۷-۷۸ شماره ۱۳۷۷-۷۸. شماره ۷۹/۰۱. معاون برنامه ریزی و بودجه کشاورزی، تهران، ایران.
- ۳-علیپور، ز و ملکوتی، م.(۱۳۸۲). نقش باکتری های محرک رشد (PGPR) در رشد و سلامت گیاه . نشریه فنی شماره ۳۰۹، موسسه تحقیقات خاک و آب.
- ۴-ملکوتی، ج. ۱۳۷۸. ضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد ارقام پرمحصول (قسمت دوم). نشریه فنی شماره ۷۱،شورایعالی سیاستگزاری توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی، کرج، ایران.
- 5-Amer, F. M. E.Saleh and H.f. Mostafa. 1991. Phosphate behavior. In submerged calcareous soils. Soil Sci., 151:306-311.
- 6- Lynch, Y.M. 1983. Soil Biotechnology, Microbiological Factors in Crop productivity, Blackwell, Oxford, 191P.
- 7- Mishutin, E.N., and A.N.Naumova. 1982. Bacterial fertilizers, their effectiveness and mode of action. Microbiology. 31:545-555